

病害虫情報 11月の予報

情報提供：神奈川県農業技術センター病害虫防除部

平成 27 年 10 月 30 日

神奈川県農業共済組合

病害虫情報(第8号)11月予報

平成27年10月30日
神奈川県農業技術センター

病害虫防除部 TEL 0463 - 58 - 0333
インターネット <http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f450002/>

【内容】

- I 11月の主な病害虫の発生予想、防除要否、使用する薬剤例 1
【水稲、カンキツ、抑制トマト、促成トマト、抑制キュウリ、促成イチゴ、ネギ、キャベツ、ダイコン】
- II 11月の気象予報と病害虫発生予報の根拠 8

- 農薬使用の際は、必ずラベルの記載事項を確認し、使用基準を遵守するとともに飛散防止に努めましょう。
- 掲載農薬は一般的な場合を想定し、防除効果を優先して選定しています。

※ 農薬に関する情報は、平成27年10月14日までの農薬登録情報に基づいて記載しています。

I 11月の主な病害虫の発生予想、防除要否、使用する薬剤例

【水稲】

病 害 虫 名	発生 予想 (平年比)	防除 要否	使用する薬剤例
			❖ 防除のポイント
縞葉枯病 (ひこばえ、水田内 雑草、水田周辺雑 草)	—	—	❖ 媒介虫のヒメビウンカの越冬場所を減らす目的で次の対策を実施する。 ①「ひこばえ」や水田内雑草をすき込む。 ②冬期～春期の畦畔や休耕田の除草を徹底する。
スクミリンゴガイ 越冬貝	—	—	❖ スクミリンゴガイ越冬貝生存率を下げる目的で次の対策を実施する。 ①貝を低温にさらすことや、貝殻を傷つけることを目的とした耕うん。 ②休耕田も発生源になるので、できるだけ①の対策を実施する。 ③越冬場所を減らすことを目的とした用排水路の泥あげ。

[防除要否] ◎:追加防除が必要 ○:通常防除 △:必要に応じて防除 ×:防除の必要なし
[使用時期] 「収穫*日前まで」を「*日」に、「収穫前日まで」を「前日」に省略

病害虫情報

(平成27年・第8号・11月) 神奈川県農業技術センター

【カンキツ】 生育: やや早(足柄地区事務所: 普通温州)

病害虫名	発生予想 (平年比)	防除要否	使用する薬剤例 ◆防除のポイント
貯蔵病害 青かび病 緑かび病 軸腐病 黒腐病	並	○	(予・治) ベフトップジンフロアブル 青かび病、緑かび病、軸腐病、黒腐病 みかん:[7日,3回] 1,500倍 みかんを除くかんきつ:[前日,2回] 1,500倍 (予・治) トップジンM水和剤 青かび病、緑かび病、軸腐病 [前日,5回] 2,000~3,000倍 等 ◆ 収穫時に傷を付けないように注意し、傷果は貯蔵庫に持込まないようにする。
ミカンハダニ	やや少	○	ダニサラバフロアブル [前日,2回] 1,000~2,000倍 オマイト水和剤 みかん:[7日,2回] 750倍 みかんを除くかんきつ:[14日,2回] 750倍 等 ◆ 収穫果を長期貯蔵する場合は防除する。

[防除要否] ◎:追加防除が必要 ○:通常防除 △:必要に応じて防除 ×:防除の必要なし
[使用時期] 「収穫*日前まで」を「*日」に、「収穫前日まで」を「前日」に省略

薬剤耐性菌の発生を防ぐために(以下の農薬は、病害虫情報に掲載(予定)されているものです。)

- ◎ QoI剤とSDHI剤は、薬剤耐性菌発生のリスクが高いため、1年間での使用回数を制限することが望ましい農薬です。
 - ▶ QoI剤(ストロビー、ファンタジスタ)
 - 単剤あるいはSDHI剤との混合剤(ナリア)の場合:1年1回
 - その他の殺菌剤との混用の場合:1年2回

【抑制トマト】

病害虫名	発生予想 (平年比)	防除要否	使用する薬剤例 ◆防除のポイント
コナジラミ類 タバココナジラミ	やや少	○	アニキ乳剤 [前日,3回]1,000~ 2,000倍 アルバリン 又は スタークル顆粒水溶剤 [前日,2回] 2,000~3,000倍 モスピラン顆粒水溶剤 [前日,3回] 2,000倍 サンクリスタル乳剤 [前日,-] 300倍 等 ◆ TYLCV(黄化葉巻病)を媒介。栽培終了時は施設内に残さないように、また施設外に出さないようにする。

[防除要否] ◎:追加防除が必要 ○:通常防除 △:必要に応じて防除 ×:防除の必要なし
[使用時期] 「収穫*日前まで」を「*日」に、「収穫前日まで」を「前日」に省略

病害虫情報

(平成27年・第8号・11月) …………… 神奈川県農業技術センター

【促成トマト】

病害虫名	発生予想 (平年比)	防除 要否	使用する薬剤例 ◆防除のポイント
コナジラミ類 タバココナジラミ	やや少	○	【育苗期:株元散布】 アルバリン 又は スタークル粒剤 [育苗期,1回] コナジラミ類、ハモグリバエ類:1~2g/株 【育苗期:散布】 ベストガード水溶剤 [前日,3回] コナジラミ類、アブラムシ類:1,000~2,000倍、 アザミウマ類:1,000倍 コルト顆粒水和剤 [前日,3回] コナジラミ類、アブラムシ類:4,000倍 【育苗期:株元灌注】 プレバゾンフロアブル5 [育苗期後半~定植当日,1回] コナジラミ類、ハモグリバエ類:100倍、25ml/株 【定植時:植穴施用】 モスピラン粒剤 [定植時,1回] コナジラミ類、アブラムシ類、トマトハモグリバエ:1g/株 ダントツ粒剤 [定植時,1回] コナジラミ類、アブラムシ類、マメハモグリバエ:1~2g/株 トマトハモグリバエ:2g/株
アブラムシ類	—	○	
アザミウマ類	—	○	
ハモグリバエ類	—	○	
			◆ CMV等(モザイク病)の感染を防ぐためにはアブラムシ類の防除が、TYLCV(黄化葉巻病)の感染を防ぐためには、タバココナジラミの防除が、TSWV(黄化えそ病)およびCSNV(茎えそ病)の感染を防ぐにはアザミウマ類の防除が重要。 ◆ コナジラミ類防除は、飛込み抑制として施設のネット展張、発生確認として黄色粘着板の吊下げが望ましい。さらに施設内外の除草を徹底すること。

[防除要否] ◎:追加防除が必要 ○:通常防除 △:必要に応じて防除 ×:防除の必要なし
 [使用時期] 「収穫*日前まで」を「*日」に、「収穫前日まで」を「前日」に省略

薬剤耐性菌の発生を防ぐために(以下の農薬は、病害虫情報に掲載(予定)されているものです。)

- ◎ QoI剤とSDHI剤は、薬剤耐性菌発生のリスクが高いため、1作での使用回数を制限することが望ましい農薬です。
 - ▶ QoI剤(アミスター20、ファンタジスタ)
 - 単剤あるいはSDHI剤との混用の場合:1作1回
 - SDHI剤以外の殺菌剤との混用もしくは混合剤(アミスターオプティ、ホライズン)の場合:1作2回
 - ▶ SDHI剤(アフェット、カンタス)
 - 単剤あるいはQoI剤との混用の場合:1作1回
 - QoI剤以外の殺菌剤との混用の場合:1作2回

病害虫情報

(平成27年・第8号・11月) …………… 神奈川県農業技術センター

【抑制キュウリ】

病害虫名	発生予想 (平年比)	防除要否	使用する薬剤例 ◆防除のポイント
べと病	やや多	○	(予・治) ホライズンドライフフロアブル [前日,3回] 2,500倍 ☞ ホライズンは混合剤。総使用回数に注意する。 (予・治) エトフィンフロアブル [前日,4回] 1,000倍 (予・治) ハチハチ乳剤 [前日,2回] 1,000倍 等 ◆ 草勢低下と夜間の結露等による葉の濡れが発生を助長する。
うどんこ病	やや多	○	(予) インプレッション水和剤 [発病前～発病初期,-] 500～1,000倍 (予・治) ベルクートフロアブル [前日,5回] 2,000倍 (予・治) パンチョTF顆粒水和剤 [前日,2回] 2,000倍 ☞ パンチョは混合剤。総使用回数に注意する。 (予・治) ハチハチ乳剤 [前日,2回] 1,000倍 等 ◆ 乾燥で発生が助長されるので、日中の過乾燥に注意する。
褐斑病	やや多	○	(予・治) ベルクートフロアブル [前日,5回] 2,000倍 (予・治) スミブレンド水和剤 [前日,5回] 1,500～2,000倍 ☞ スミブレンドは混合剤。総使用回数に注意する。 (予・治) ハチハチ乳剤 [前日,2回] 1,000倍 等 ◆ 多湿状態で施設を密閉すると蔓延しやすく、夜間の結露等による葉の濡れが発生を助長する。
コナジラミ類 タバココナジラミ	やや少	○	ハチハチ乳剤 [前日,2回] 1,000～2,000倍 アルバリン 又は スタークル顆粒水溶剤 [前日,2回] コナジラミ類:2,000～3,000倍、アザミウマ類:2,000倍
アザミウマ類 ミナミキイロ アザミウマ	やや多	○	アファームエクセラ顆粒水和剤 [前日,2回] ミナミキイロアザミウマ:1,500倍 ☞ アファームエクセラは混合剤。総使用回数に注意する。 コテツフロアブル [前日,3回] ミナミキイロアザミウマ:2,000倍 等 ◆ 施設内外の除草を徹底するとともに、栽培に関係のない鉢物等を施設内に持ち込まないこと。 ◆ CCYV(退緑黄化病)の感染を防ぐためにはコナジラミ類、MYS V(黄化えそ病)の感染を防ぐためにはアザミウマ類の防除が重要。

[防除要否] ◎:追加防除が必要 ○:通常防除 △:必要に応じて防除 ×:防除の必要なし
[使用時期] 「収穫*日前まで」を「*日」に、「収穫前日まで」を「前日」に省略

薬剤耐性菌の発生を防ぐために(以下の農薬は、病害虫情報に掲載(予定)されているものです。)

- QoI剤とSDHI剤は、薬剤耐性菌発生のリスクが高いので、1作での使用回数を制限することが望ましい農薬です。
 - ▶ QoI剤(アミスター20、ファンタジスタ)
 - 単剤あるいはSDHI剤との混用の場合:1作1回
 - SDHI以外の殺菌剤との混用もしくは混合剤(アミスターオプティ、ファンベル、ホライズン)の場合:1作2回
 - ▶ SDHI剤(アフェット、カンタス)
 - 単剤あるいはQoI剤との混用の場合:1作1回
 - QoI剤以外の殺菌剤との混用の場合:1作2回
- CAA系薬剤は、薬剤耐性菌発生のリスクがあるので、1作での使用回数を制限することが望ましい農薬です。
 - 単剤(フェスティバル水和剤)の場合:1作1回
 - CAA系薬剤以外の殺菌剤との混用もしくは混合剤(プロポーズ、ベトファイター)の場合:1作2回

病害虫情報

(平成27年・第8号・11月) …………… 神奈川県農業技術センター

【促成イチゴ】

病害虫名	発生予想 (平年比)	防除要否	使用する薬剤例 ❖防除のポイント
うどんこ病	多	◎	(予) インプレッション水和剤 [発病前～発病初期, -] 500～1,000倍 (予) タフパール [発病前～発病初期, -] 2,000～4,000倍 (予) フルピカフロアブル [前日, 3回] 2,000～3,000倍 (治) サンクリスタル乳剤 [前日, -] 300～600倍 (治) カリグリーン [前日, -] 800～1000倍 (予・治) アフェットフロアブル [前日, 3回] 2,000倍 等 ❖ 平成27年9月8日にうどんこ病に関する注意報を発表。
アブラムシ類	やや少	○	ウララDF [前日, 2回] 2,000～4,000倍 サンクリスタル乳剤 [前日, -] 300倍 等
ハスモンヨトウ	やや少	○	プレバゾンフロアブル5 [前日, 2回] 2,000倍 トルネードエースDF [前日, 2回] 2,000倍 カスケード乳剤 [前日, 3回] 4,000倍 等
ハダニ類	並	○	マイトコーネフロアブル [前日, 2回] 1,000倍 サンクリスタル乳剤 [前日, -] 300～600倍 等

[防除要否] ◎:追加防除が必要 ○:通常防除 △:必要に応じて防除 ×:防除の必要なし
[使用時期] 「収穫*日前まで」を「*日」に、「収穫前日まで」を「前日」に省略

ミツバチへの影響

- ▶ 農薬散布の際は、巣箱を施設から出し、巣箱を再導入する前には、換気を十分に行い、薬液が乾いていることを確認すること。
- ▶ 影響のある剤:アフェット(1日)

ミヤコカブリダニ、チリカブリダニへの影響(アリストライフサイエンス 作物保護製品ガイド2015より)

- ▶ 影響のある剤:サンクリスタル(多少影響あり)

薬剤耐性菌の発生を防ぐために(以下の農薬は、病害虫情報に掲載(予定)されているものです。)

- QoI剤とSDHI剤は、薬剤耐性菌発生リスクが高いので、1作での使用回数を制限することが望ましい農薬です。
 - ▶ QoI剤(アミスター20、ストロビー、ファンタジスタ)
 - 単剤の場合:1作1回
 - その他の殺菌剤との混用もしくは混合剤(ファンベル)の場合:1作2回
 - ▶ SDHI剤(アフェット、カンタス)
 - 単剤の場合:1作1回
 - その他の殺菌剤との混用の場合:1作2回

病害虫情報

(平成27年・第8号・11月) …………… 神奈川県農業技術センター

【ネギ】

病害虫名	発生予想 (平年比)	防除 要否	使用する薬剤例 ◆防除のポイント
さび病	やや多	○	(予・治) アミスター20フロアブル [3日,4回] 2,000倍 (予・治) ラリー水和剤 [7日,3回] さび病:2,000倍
黒斑病	やや多	○	
ネギアザミウマ	やや少	○	アニキ乳剤 [3日,3回] ネギアザミウマ:1,000倍、
シロイチモジヨトウ	やや少	○	シロイチモジヨトウ:1,000～2,000倍 ベストガード水溶剤 [前日,3回] ネギアザミウマ:1,000倍 スピノエース顆粒水和剤 [3日,3回] アザミウマ類:2,500～5,000倍 シロイチモジヨトウ:5,000倍

[防除要否] ◎:追加防除が必要 ○:通常防除 △:必要に応じて防除 ×:防除の必要なし
[使用時期] 「収穫*日前まで」を「*日」に、「収穫前日まで」を「前日」に省略

【キャベツ】

病害虫名	発生予想 (平年比)	防除 要否	使用する薬剤例 ◆防除のポイント
菌核病	—	○	(予) セイビアーフロアブル20 [3日,3回] 1,000倍 (予・治) トップジンM水和剤 [3日,2回] 1,000～1,500倍 (予・治) カンタスドライフロアブル [7日,2回] 1,500倍 ◆ 被害株は感染源になるため、速やかに除去する。
コナガ	並	○	アニキ乳剤 [3日,3回] 1,000～2,000倍 アクセルフロアブル [前日,3回]
ハスモンヨトウ	並	○	コナガ:1,000倍 ハスモンヨトウ、オオタバコガ:1,000～2,000倍
オオタバコガ	並	○	

[防除要否] ◎:追加防除が必要 ○:通常防除 △:必要に応じて防除 ×:防除の必要なし
[使用時期] 「収穫*日前まで」を「*日」に、「収穫前日まで」を「前日」に省略

病害虫情報

(平成27年・第8号・11月) …………… 神奈川県農業技術センター

▼ 三浦半島地区野菜 ▼

【キャベツ】

病虫害名	発生予想 (平年比)	防除要否	使用する薬剤例 ◆防除のポイント
黒腐病	並	○	(予) Zボルドー [ー,ー] 500倍 (予・治) カセット水和剤 [7日,3回] 1,000倍 ☞ カセットは混合剤。総使用回数に注意する。 等 ◆ Zボルドー:薬害が懸念される場合は、クレフノン(100~200倍)を加用する。結球後に使用すると薬害を生じる可能性があるの で注意する。
菌核病	ー	○	(予) セイビアーフロアブル20 [3日,3回] 1,000倍 (予・治) トップジンM水和剤 [3日,2回] 1,000~1,500倍 等 ◆ 被害株は感染源になるため、速やかに除去する。
コナガ	並	○	アニキ乳剤 [3日,3回] 1,000~2,000倍 アクセルフロアブル [前日,3回]
ハスモンヨトウ	並	○	コナガ:1,000倍 ハスモンヨトウ、オオタバコガ:1,000~2,000倍 等
オオタバコガ	並	○	

[防除要否] ◎:追加防除が必要 ○:通常防除 △:必要に応じて防除 ×:防除の必要なし
[使用時期] 「収穫*日前まで」を「*日」に、「収穫前日まで」を「前日」に省略

【ダイコン】

病虫害名	発生予想 (平年比)	防除要否	使用する薬剤例 ◆防除のポイント
黒斑細菌病	並	○	(予) Zボルドー [ー,ー] 500倍 (予・治) カセット水和剤 [7日,3回] 1,000倍 ☞ カセットは混合剤。総使用回数に注意する。 等 ◆ 肥料切れしないよう適正な肥培管理をする。 ◆ Zボルドー:薬害が懸念される場合は、クレフノン(100~200倍)を加用する。
白さび病 (ワッカ症)	並	○	(予・治) ハチハチ乳剤 [14日,2回] 1,000倍 (予・治) ランマンフロアブル [3日,3回] 2,000倍 等 ◆ ワッカ症の防除のために11月上旬に薬剤散布を行うこと。
ナモグリバエ	並	○	ハチハチ乳剤 [14日,2回] 1,000~2,000倍 アドマイヤーフロアブル [14日,2回] アブラムシ類:4,000倍 スピノエース顆粒水和剤 [7日,3回] コナガ:2,500~5,000倍 等
アブラムシ類	並	○	
コナガ	並	○	

[防除要否] ◎:追加防除が必要 ○:通常防除 △:必要に応じて防除 ×:防除の必要なし
[使用時期] 「収穫*日前まで」を「*日」に、「収穫前日まで」を「前日」に省略

病害虫情報

(平成27年・第8号・11月)

神奈川県農業技術センター

II 11月の気象予報と病害虫発生予報の根拠

(1) 11月の気象予報(気象庁 地球環境・海洋部10月23日発表3か月予報)

〈天 気〉

平年に比べ晴れの日が少ないでしょう。

〈要素別予報〉

	低い(少ない)	平年並み	高い(多い)
気 温	20%	40%	40%
降 水 量	20%	40%	40%
日照時間*	40%	40%	20%

*10月22日発表1か月予報による。

(2) 11月の病害虫発生予報の根拠

作物名	病害虫名	発生量		予報の根拠
		程度	平年比	
カンキツ	貯蔵病害 青かび病 緑かび病 黒腐病 軸腐病	—	並	1) 果実の青かび病、緑かび病等の樹上発病は平年並。(±) 2) 軸腐病と同じ病原菌である黒点病の発生は、巡回調査では平年並、県予察ほ(根府川)では平年より少ない。(—) 3) 本年の着果量は平年並(±)、果皮の厚さは平年より厚く(—)、減酸は平年より早い(+).
	ミカンハダニ	少	やや少	1) 巡回調査では、発生が平年並。(±) 2) 県予察ほ(根府川)の慣行防除園では、寄生が見られず発生が平年より少ない。(—) 3) 気温は平年並か高く、降水量は平年並か多い予報。(+)
抑制トマト 促成トマト	タバココナジラミ	少	やや少	1) 抑制トマトの巡回調査では、発生が6年平均より少ない。(—) 2) 気温は平年並か高く、降水量は平年並か多い予報。(±)
抑制キュウリ	べと病	中	やや多	1) 巡回調査では、発生が平年より多い。(+) 2) 気温は平年並か高く、降水量は平年並か多く、日照時間は平年並か少ない予報。(+)
	うどんこ病	中	やや多	1) 巡回調査では、発生が平年並。(±) 2) 気温は平年並か高く、降水量は平年並か多く、日照時間は平年並か少ない予報。(+)
	褐斑病	少	やや多	1) 巡回調査では、発生が平年並。(±) 2) 気温は平年並か高く、降水量は平年並か多く、日照時間は平年並か少ない予報。(+)
	タバココナジラミ	少	やや少	1) 巡回調査では、発生が9年平均より少ない。(—) 2) 気温は平年並か高く、降水量は平年並か多い予報。(±)
	ミナミキイロアザミウマ	少	やや多	1) 巡回調査では、発生が平年より多い。(+) 2) 気温は平年並か高く、降水量は平年並か多い予報。(±)

※「発生量」…………… 程度:甚>多>中>少>無 平年比:多>やや多>並>やや少>少
「予報の根拠」…………… (+):多発要因 (—):少発要因

病害虫情報

(平成27年・第8号・11月)

神奈川県農業技術センター

作物名	病害虫名	発生量		予報の根拠
		程度	平年比	
促成イチゴ	うどんこ病	中	多	1) 巡回調査では、発生が平年より多い。(+) 2) 気温は平年並か高く、降水量は平年並か多く、日照時間は平年並か少ない予報。(+)
	アブラムシ類	少	やや少	1) 巡回調査では、発生が平年より少ない。(－) 2) 気温は平年並か高く、降水量は平年並か多い予報。(±)
	ハダニ類	少	並	1) 巡回調査では、発生が平年並。(±) 2) 気温は平年並か高く、降水量は平年並か多い予報。(±)
ネギ	さび病	少	やや多	1) 巡回調査では、発生が平年よりやや多い。(+) 2) 気温は平年並か高く、降水量は平年並か多い予報。(+)
	黒斑病	中	やや多	1) 巡回調査では、発生が平年並。(±) 2) 気温は平年並か高く、降水量は平年並か多い予報。(+)
	ネギアザミウマ	多	やや少	1) 巡回調査では、発生が平年より少ない。(－) 2) 気温は平年並か高く、降水量は平年並か多い予報。(±)
	シロイチモジヨトウ	－	やや少	1) フェロモントラップへの誘殺数は、横浜、三浦、伊勢原ともに平年より少ない。(－) 2) 県予察ほ(上吉沢)のフェロモントラップへの誘殺数は、平年よりやや少ない。(－) 3) 気温は平年並か高く、降水量は平年並か多い予報。(±)
キャベツ (三浦半島地区を除く)	コナガ	少	並	1) 巡回調査では、発生が平年並。(±) 2) 横浜のフェロモントラップへの誘殺数は、平年並。(±) 3) 県予察ほ(上吉沢)のフェロモントラップへの誘殺数は、平年並。(±) 4) 気温は平年並か高く、降水量は平年並か多い予報。(±)
露地野菜 全般 (三浦半島地区を除く)	ハスモンヨトウ	－	並	1) キャベツの巡回調査では寄生が平年並み(+)、ダイコンの巡回調査では、発生が平年より少ない(－)。 2) フェロモントラップへの誘殺数は、横浜は平年より多く(+)、伊勢原は平年より少ない(－)。 3) 県予察ほ(上吉沢)のフェロモントラップへの誘殺数は、平年並。(±) 4) 気温は平年並か高く、降水量は平年並か多い予報。(±)
	オオタバコガ	－	並	1) キャベツの巡回調査では、発生が平年よりやや少ない。(－) 2) フェロモントラップへの誘殺数は、横浜は平年並み(±)、伊勢原は平年より少ない(－)。 3) 県予察ほ(上吉沢)のフェロモントラップへの誘殺数は、平年より多い。(+) 4) 気温は平年並か高く、降水量は平年並か多い予報。(±)

※「発生量」……………程度:甚>多>中>少>無 平年比:多>やや多>並>やや少>少
「予報の根拠」……………(+):多発要因 (－):少発要因

病害虫情報

(平成27年・第8号・11月) …… 神奈川県農業技術センター

三浦半島地区野菜

作物名	病害虫名	発生量		予報の根拠
		程度	平年比	
キャベツ	黒腐病	少	並	1) 巡回調査では、発病は見られず、発生が平年並。(±) 2) 気温は平年並か高く、降水量は平年並か多い予報。(+)
	コナガ	少	並	1) 巡回調査では、発生が平年並。(±) 2) 三浦のフェロモントラップへの誘殺数は、平年並。(±) 3) 気温は平年並か高く、降水量は平年並か多い予報。(±)
ダイコン	黒斑細菌病	少	並	1) 巡回調査では、発病は見られず、発生が平年並。(±) 2) 気温は平年並か高く、降水量は平年並か多い予報。(+)
	白さび病	少	並	1) 巡回調査では、発病は見られず、発生が平年並。(±) 2) 気温は平年並か高く、降水量は平年並か多い予報。(+)
	ナモグリバエ	少	並	1) 巡回調査では、発生が平年並。(±) 2) 気温は平年並か高く、降水量は平年並か多い予報。(±)
	アブラムシ類	少	並	1) 巡回調査では、発生が平年よりやや少ない。(－) 2) 気温は平年並か高く、降水量は平年並か多い予報。(±)
	コナガ	少	並	1) 巡回調査では、寄生は見られず、発生が平年より少ない。(－) 2) 三浦のフェロモントラップへの誘殺数は、平年並。(±) 3) 気温は平年並か高く、降水量は平年並か多い予報。(±)
露地野菜全般	ハスモンヨトウ	－	並	1) キャベツの巡回調査では寄生が平年より少ない。(－) 2) 三浦のフェロモントラップへの誘殺数は、平年並。(±) 3) 気温は平年並か高く、降水量は平年並か多い予報。(±)
	オオタバコガ	－	並	1) キャベツの巡回調査では、寄生は見られず、発生が平年並み。(±) 2) 三浦のフェロモントラップへの誘殺数は、平年並。(±) 3) 気温は平年並か高く、降水量は平年並か多い予報。(±)

※「発生量」…………… 程度:甚>多>中>少>無 平年比:多>やや多>並>やや少>少
「予報の根拠」…………… (+):多発要因 (－):少発要因